



Mevet

## Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

## CEMAY 50 mg/ml Suspensión inyectable para porcino y bovino Ceftiofur hidrocloreuro



## Inyectables

### Mevet

Polígono Industrial El Segre  
Parc. 409-410  
25191 Lleida, España  
T. +34 973 210 269  
[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

Comercializado por

### Albio Ferm

Polígono Industrial Can Salvatella  
C. Mogoda, 16-18  
08210 Barberà del Vallès, España  
T. +34 93 729 17 64

## Inyectables

### CEMAY 50 mg/ml Suspensión inyectable para porcino y bovino



#### Ceftiofur hidrocloreuro

#### COMPOSICIÓN POR ml

##### Sustancia activa:

Ceftiofur (hidrocloreuro) 50 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Porcino y bovino.

#### INDICACIONES DE USO

Infecciones asociadas con bacterias sensibles a ceftiofur.

**Porcino:** tratamiento de infecciones respiratorias asociadas con *Pasteurella multocida*, *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Streptococcus suis*.

**Bovino:** tratamiento de la enfermedad respiratoria bacteriana asociada a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* y *Haemophilus somnus*.

Tratamiento de la necrobacilosis interdigital aguda (panadizo, inflamación de la pezuña) asociada a *Fusobacterium necrophorum* y *Bacteroides melaninogenicus* (*Porphyromonas asaccharolytica*).

Tratamiento del componente bacteriano de la metritis aguda posparto (puerperal) en los 10 días siguientes al parto asociada a *Escherichia coli*, *Arcanobacterium pyogenes* y *Fusobacterium necrophorum*, sensibles al ceftiofur.

La indicación se limita a los casos en que el tratamiento con otro antimicrobiano haya fracasado.

#### TIEMPO DE ESPERA

**Porcino:** carne: 5 días.

**Bovino:** carne: 8 días. leche: 0 días.

#### POSOLÓGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular en porcino y subcutánea en bovino.

**Porcino:** 3 mg de ceftiofur/kg p.v./día durante 3 días por vía intramuscular, es decir 1 ml de medicamento/16 kg p.v. por cada inyección.

**Bovino:** enfermedad respiratoria: 1 mg de ceftiofur/kg p.v./día durante 3 - 5 días por inyección subcutánea, es decir, 1 ml de medicamento/50 kg p.v. en cada inyección.

Necrobacilosis interdigital aguda: 1 mg de ceftiofur/kg p.v./día durante 3 días por inyección subcutánea, es decir, 1 ml de medicamento/50 kg p.v. en cada inyección.

Metritis posparto aguda en los 10 días posteriores al parto: 1 mg de ceftiofur/kg p.v./día durante 5 días consecutivos por inyección subcutánea, es decir, 1 ml de medicamento/50 kg p.v. en cada inyección.

En caso de metritis posparto aguda, en algunos casos puede ser necesaria terapia de apoyo adicional.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

#### FORMATOS

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 vial de 250 ml

#### Nº REGISTRO

2333 ESP