



## Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

**PROBENCIL 300 mg/ml**

**Suspensión inyectable para bovino y porcino**

Bencilpenicilina procaína



**Inyectables**

### Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

## Inyectables

### PROBENCIL 300 mg/ml Suspensión inyectable para bovino y porcino Bencilpenicilina procaína



#### COMPOSICIÓN POR ml

**Sustancia activa:**  
Bencilpenicilina procaína 300 mg

**Excipientes:**  
Parahidroxibenzoato de metilo sódico (E 219) 1,25 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Bovino y porcino (>25 kg).

#### INDICACIONES DE USO

Para el tratamiento de infecciones sistémicas en bovino y porcino (mayor de 25 kg de peso) causadas por bacterias sensibles a la penicilina.

#### TIEMPOS DE ESPERA

**Porcino:** Carne: 6 días.

**Bovino:** Carne: 6 días.

Leche: 96 horas (4 días).

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración intramuscular. Agitar antes de usar.

La dosis recomendada es 10 mg/kg p.v. /día de bencilpenicilina procaína, equivalente a 1 ml/30 kg p.v. /día durante 3-5 días.

No administrar más de 2,5 ml por punto de inyección en porcino.

No administrar más de 12 ml por punto de inyección en bovino.

Si no se observa respuesta clínica en 3 días, revisar el diagnóstico y cambiar de tratamiento si es necesario.

Para asegurar una correcta dosificación, debe determinarse el peso del animal tan exacto como sea posible para evitar una dosificación insuficiente.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

#### FORMATOS

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 frasco de 250 ml

#### Nº REGISTRO

3745 ESP

