



Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Nutracéuticos

Desinfectantes / Higiene

DOXICIVALL POLVO

Polvo para solución oral

Doxiciclina hiclato



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Orales

DOXICIVALL POLVO

Polvo para solución oral

Doxiciclina hiclato



COMPOSICIÓN POR g

Sustancia activa:

Doxiciclina (hiclato) 500 mg

ESPECIES DE DESTINO

Cerdos de cebo y pollos

INDICACIONES DE USO

Cerdos de cebo: prevención y tratamiento del Complejo Respiratorio Porcino causado por cepas sensibles de *Bordetella bronchiseptica* y *Pasteurella multocida*.

Pollos: colibacilosis, CRD y micoplasmosis.

TIEMPO DE ESPERA

Cerdos de cebo: carne: 6 días.

Pollos: carne: 4 días.

Huevos: no está permitido su uso en aves cuyos huevos se destinan a consumo humano.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía oral, en el agua de bebida.

Cerdos de cebo: 10 mg de doxiciclina (hiclato)/kg p.v./día durante 5 días, equivalente a 20 mg de medicamento/kg p.v./día durante 5 días.

Pollos: 20 mg de doxiciclina (hiclato)/kg p.v./día durante 3-5 días consecutivos, equivalente a 40 mg de medicamento/kg p.v./día durante 3-5 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a no más de 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

FORMATOS

Bolsa con 200 g

Bolsa con 1 kg

Nº REGISTRO

1260 ESP

