



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

CORDEXVALL 1,9 mg/ml Solución inyectable

Fosfato sódico de dexametasona



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Inyectables

CORDEXVALL 1,9 mg/ml Solución inyectable

Fosfato sódico de dexametasona



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Dexametasona (fosfato sódico) 1,9 mg

Excipientes:

Parahidroxibenzoato de metilo (E 218) 1,8 mg

Parahidroxibenzoato de propilo 0,2 mg

ESPECIES DE DESTINO

Caballos, porcino, perros y gatos.

INDICACIONES DE USO

Procesos inflamatorios y alérgicos, y traumatismos.

TIEMPO DE ESPERA

Porcino: carne, 7 días.

Caballos: carne, 12 días.

POSOLÓGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

Caballos: 0,02-0,08 mg de dexametasona/kg p.v. (equivalente a 0,1-0,4 ml de medicamento/10 kg p.v.). Dosis única o cada 48 h durante un máximo de 5 días.

Porcino: 0,08 mg de dexametasona/kg p.v. (equivalente a 0,4 ml de medicamento/10 kg p.v.). Dosis única o cada 24 h durante un máximo de 5 días.

Perros: 0,05-0,2 mg de dexametasona/kg p.v. (equivalente a 0,025-0,1 ml de medicamento/kg p.v.). Dosis única o cada 24 h durante un máximo de 5 días.

Gatos: 0,1-0,3 mg de dexametasona/kg p.v. (equivalente a 0,05-0,15 ml de medicamento/kg p.v.). Dosis única o cada 24 h durante un máximo de 5 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

FORMATOS

Caja con 1 vial de 20 ml

Caja con 20 viales de 20 ml

Caja con 1 vial de 50 ml

Caja con 10 viales de 50 ml

Nº REGISTRO

2100 ESP

