



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

ENROVALL 50 mg/ml

Solución inyectable

Enrofloxacino



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Inyectables

ENROVALL 50 mg/ml Solución inyectable Enrofloxacinó



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Enrofloxacinó 50 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519) 14 mg

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (terneros) y porcino.

INDICACIONES DE USO

Terminos: tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida*, *Mannheimia haemolytica* y *Mycoplasma* spp. sensibles al enrofloxacinó. Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacinó. Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacinó. Tratamiento de la artritis aguda asociada a micoplasmas, causada por cepas de *Mycoplasma bovis* sensibles al enrofloxacinó.

Porcino: tratamiento de las infecciones del tracto respiratorio causadas por cepas de *Pasteurella multocida*, *Mycoplasma* spp. y *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles al enrofloxacinó. Tratamiento de las infecciones del tracto digestivo causadas por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacinó. Tratamiento de la septicemia causada por cepas de *Escherichia coli* sensibles al enrofloxacinó.

TIEMPO DE ESPERA

Terminos: carne: 12 días.

Su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

Porcino: carne: 13 días.

POSOLÓGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía subcutánea en terneros e intramuscular en porcino.

Terminos: 5 mg de enrofloxacinó/kg p.v., que corresponde a 1 ml de medicamento/10 kg p.v., una vez al día por vía subcutánea durante 3 a 5 días. Artritis aguda asociada a micoplasmas, causada por cepas de *Mycoplasma bovis* sensibles al enrofloxacinó: 5 mg de enrofloxacinó/kg p.v., que corresponde a 1 ml de medicamento/10 kg p.v., una vez al día por vía subcutánea durante 5 días.

Porcino: 2,5 mg de enrofloxacinó/kg p.v., que corresponde a 0,5 ml de medicamento/10 kg p.v., una vez al día por vía intramuscular durante 3 días. En infecciones del tracto digestivo o septicemias causadas por *Escherichia coli*: 5 mg de enrofloxacinó/kg p.v., que corresponde a 1 ml de medicamento/10 kg p.v., una vez al día por vía intramuscular durante 3 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES

Proteger de la luz.

FORMATOS

Vidrio:

Caja con 1 vial de 100 ml
Caja con 1 vial de 250 ml
Caja con 10 viales de 100 ml
Caja con 15 viales de 250 ml

Polipropileno:

Caja con 1 vial de 250 ml
Caja con 15 de 250 ml

Nº REGISTRO

1131 ESP

