



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

LINESVALL 150 mg/ml

Solución inyectable

Hidrocloruro de lincomicina

Sulfato tetrahidrato de espectinomicina



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Inyectables

LINESVALL 150 mg/ml

Solución inyectable

Hidrocloruro de lincomicina

Sulfato tetrahidrato de espectinomicina



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Espectinomicina (sulfato tetrahidrato) 100 mg

Lincomicina (hidrocloruro) 50 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519) 9 mg

ESPECIES DE DESTINO

Porcino, bovino y perros.

INDICACIONES DE USO

Porcino: disentería porcina y neumonía enzoótica.

Bovino: neumonía.

Perros: neumonía.

TIEMPO DE ESPERA

Porcino: carne, 17 días.

Bovino: carne, 13 días.

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vía intramuscular.

Porcino: 10 mg de lincomicina + 20 mg de espectinomicina/ kg p.v./día (equivalente a 2 ml de medicamento/10 kg p.v./ día) durante 3-5 días.

Bovino: 10 mg de lincomicina + 20 mg de espectinomicina/ kg p.v./día (equivalente a 2 ml de medicamento/10 kg p.v./ día) durante 3-5 días.

Perros: 5-10 mg de lincomicina + 10-20 mg de espectinomicina/kg p.v. (equivalente a 1-2 ml de medicamento/10 kg p.v.) cada 12 horas durante 4-7 días.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

FORMATOS

Vidrio, polipropileno y polietileno:

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 vial de 250 ml

Caja con 10 viales de 100 ml

Caja con 15 viales de 250 ml

Nº REGISTRO

377 ESP

