



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

NEKOVALL 100 mg/ml

Solución inyectable

Ketoprofeno



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Inyectables

NEKOVALL 100 mg/ml Solución inyectable Ketoprofeno



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Ketoprofeno 100 mg

Excipientes:

Alcohol bencílico (E 1519) 10 mg

ESPECIES DE DESTINO

Caballos, bovino y porcino.

INDICACIONES DE USO

Caballos: tratamiento de los estados inflamatorios y dolorosos de los sistemas osteoarticular y músculo esquelético del caballo de deporte y carrera. Tratamiento sintomático de los cólicos.

Bovino: tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético en el caso de procesos inflamatorios músculo esqueléticos, mamitis, edema mamario, procesos inflamatorios asociados a enfermedades respiratorias, cólicos.

Porcino: tratamiento antiinflamatorio, analgésico y antipirético en enfermedades agudas. En las cerdas para el síndrome mastitis, metritis-agalaxia.

TIEMPOS DE ESPERA

Caballos: carne, 4 días.

Bovino: carne, 4 días. Leche, 0 horas.

Porcino: carne, 4 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Caballos: exclusivamente vía intravenosa.

Bovino: vía intravenosa o intramuscular.

Porcino: exclusivamente vía intramuscular.

Caballos: tratamiento de las afecciones del sistema músculo esquelético y osteoarticular: 2,2 mg de ketoprofeno/kg p.v./día, equivalente a 1 ml de medicamento/45 kg p.v./día, durante 3-5 días consecutivos.

Tratamiento sintomático de los cólicos: 2,2 mg de ketoprofeno/kg p.v., equivalente a 1 ml de medicamento/45 kg p.v., en una única inyección.

Generalmente es suficiente una única inyección; cualquier inyección suplementaria debe ser precedida por una reevaluación clínica del animal.

Bovino: 3 mg de ketoprofeno/kg p.v./día, equivalente a 1 ml de medicamento/33 kg p.v./día, durante 1-3 días consecutivos.

Porcino: 3 mg de ketoprofeno/kg p.v./día, equivalente a 1 ml de medicamento/33 kg p.v./día, durante 1-3 días consecutivos.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

FORMATOS

Vidrio:

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 10 viales de 100 ml

Polipropileno:

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 vial de 250 ml

Caja con 10 viales de 100 ml

Caja con 15 viales de 250 ml

Nº REGISTRO

2153 ESP

