



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

OXIPART-VALL

Solución inyectable

Oxitocina



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Inyectables

OXIPART-VALL Solución inyectable

Oxitocina



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Oxitocina 10 UI

Excipientes:

Clorobutanol hemihidrato 5 mg

ESPECIES DE DESTINO

Yeguas, vacas, ovejas, cabras, cerdas, perras y gatas.

INDICACIONES DE USO

Inducción al parto. Inercia o atonía uterina. Involución del útero tras cesáreas y disminución de hemorragias. Expulsión de secundinas y restos de exudados tras el parto. Agalaxia de la cerda. Piometritis y endometritis crónicas para provocar la expulsión de exudados. Tratamiento coadyuvante a la terapia antibiótica de la mastitis aguda y crónica para provocar la expulsión de residuos y facilitar el drenaje.

TIEMPOS DE ESPERA

Carne: 0 días. **Leche:** 0 días.

POSOLÓGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Vías de administración: intravenosa, intramuscular y subcutánea.

OBSTETRICIA:

Yeguas: 7,5-15 ml de medicamento/animal (equivalente a 75-150 UI de oxitocina/animal).

Vacas: 7,5-10 ml de medicamento/animal (equivalente a 75-100 UI de oxitocina/animal).

Ovejas, cabras y cerdas: 3-5 ml de medicamento/animal (equivalente a 30-50 UI de oxitocina/animal).

Perras: 0,5-2,5 ml de medicamento/animal (equivalente a 5-25 UI de oxitocina/animal).

Gatas: 0,5-1 ml de medicamento/animal (equivalente a 5-10 UI de oxitocina/animal).

EYECCIÓN LÁCTEA (preferentemente vía intravenosa):

Yeguas y vacas: 1-2 ml de medicamento/animal (equivalente a 10-20 UI de oxitocina/animal).

Ovejas, cabras y cerdas: 0,5-2 ml de medicamento/ animal (equivalente a 5-20 UI de oxitocina/animal).

Perras: 0,2-1 ml de medicamento/animal (equivalente a 2-10 UI de oxitocina/animal).

Gatas: 0,1-1 ml de medicamento/animal (equivalente a 1-10 UI de oxitocina/animal).

La administración puede repetirse cada 30 minutos si el clínico lo considera necesario.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar en nevera (entre 2 °C y 8 °C).

FORMATOS

Caja con 1 vial de 100 ml

Caja con 1 vial de 250 ml

Caja con 10 viales de 100 ml

Caja con 15 viales de 250 ml

Nº REGISTRO

409 ESP

