



Mevet

Inyectables

Orales
Premezclas medicamentosas
Nutraceúticos
Desinfectantes / Higiene

PULMOVALL 300 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino y porcino

Florfenicol



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre P-410
25191 Lleida, España
T. +34 973 210 269

Inyectables

PULMOVALL 300 mg/ml

Solución inyectable para bovino, ovino y porcino

Florfenicol



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Florfenicol 300 mg

ESPECIES DE DESTINO

Bovino, ovino y porcino.

INDICACIONES DE USO

Bovino: Tratamiento y metafilaxis de la enfermedad respiratoria bovina asociada a *Mannheimia haemolytica*, *Pasteurella multocida* e *Histophilus somni* susceptibles al florfenicol. Se debe establecer la presencia de la enfermedad en el rebaño antes del tratamiento metafiláctico.

Ovino: Tratamiento de la enfermedad respiratoria ovina asociada a *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida* susceptibles al florfenicol.

Porcino: Tratamiento de brotes agudos de la enfermedad respiratoria porcina asociados a *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* susceptibles al florfenicol.

TIEMPOS DE ESPERA

Bovino: carne, por vía IM: 30 días; por vía SC: 44 días.

Ovino: Carne: 39 días.

Porcino: carne, 18 días.

Leche: su uso no está autorizado en animales cuya leche se utiliza para consumo humano, incluyendo animales gestantes cuya leche vaya a ser destinada para el consumo humano.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Intramuscular y subcutánea en bovino; intramuscular en ovino y porcino.

Para tratamiento

Bovino: Vía intramuscular: 20 mg de florfenicol/kg p.v. (1 ml del medicamento veterinario/15 kg p.v.) administrados dos veces con un intervalo de 48 horas.

Vía subcutánea: 40 mg de florfenicol/kg p.v. (2 ml de medicamento veterinario/15 kg p.v.) administrados una sola vez.

La inyección debe realizarse únicamente en el cuello.

Ovino: Vía intramuscular: 20 mg de florfenicol/kg p.v. (1 ml del medicamento veterinario/15 mg p.v.) administrada diariamente durante 3 días consecutivos.

Porcino: Vía intramuscular: 15 mg de florfenicol/kg p.v. (1 ml de medicamento veterinario/20 kg p.v.) mediante inyección intramuscular en el músculo del cuello, administrados dos veces con un intervalo de 48 horas.

Para metafilaxis

Bovino: Vía subcutánea: 40 mg de florfenicol/kg de peso vivo (2 ml de medicamento veterinario/15 kg de peso vivo) administrados una sola vez. La inyección debe administrarse sólo en el cuello.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

FORMATOS

Polipropileno:

Caja con 1 vial de 250 ml

Caja con 15 viales de 250 ml

N° DE REGISTRO

3971 ESP