



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

SINCROVALL 75 microgramos/ml **Solución inyectable para bovino, porcino y equino** D-cloprostenol sódico



Inyectables

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Inyectables

SINCROVALL 75 microgramos/ml Solución inyectable para bovino, porcino y equino

D-cloprostenol sódico



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

D-Cloprostenol (sódico) 75 microgramos

Excipientes:

Clorocresol 1 mg

ESPECIES DE DESTINO

Bovino (vacas), porcino (cerdas adultas) y equino (yeguas).

INDICACIONES DE USO

Bovino: sincronización o inducción del estro, inducción del parto, disfunción ovárica (cuerpo lúteo persistente, quistes luteínicos), endometritis/piómetra, involución uterina retardada, inducción de aborto en la primera mitad de la gestación, expulsión de fetos momificados.

Porcino: inducción del parto

Equino: inducción de luteolisis en yeguas con cuerpo lúteo funcional.

TIEMPOS DE ESPERA

Bovino: carne: cero días. Leche: cero horas.

Porcino: carne: 1 día.

Equino: carne: 2 días. Leche: cero horas.

POSOLÓGIA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Exclusivamente por vía intramuscular.

Vacas: administrar 2 ml del medicamento veterinario, equivalente a 150 microgramos de sustancia activa.

Cerdas adultas: administrar 1 ml del medicamento veterinario, equivalente a 75 µg de D-cloprostenol/animal, por vía intramuscular, no antes del día 114 de gestación. Repetir a las 6 horas. De forma alternativa, a las 20 horas de la primera dosis, se puede administrar un estimulante del miometrio (oxitocina o carazolol). Siguiendo el protocolo de la doble administración, aproximadamente el 70-80% de los animales nacerán durante las 20-30 horas posteriores a la primera administración.

Yeguas: administrar 1 ml del medicamento veterinario (equivalente a 75 microgramos de sustancia activa).

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de temperatura de conservación. Conservar el vial en el embalaje exterior con objeto de protegerlo de la luz.

FORMATOS

Caja con 1 vial de 20 ml

Caja con 5 viales de 20 ml

Nº REGISTRO

3053 ESP

