



## **Inyectables**

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

**TILMISONE 300 mg/ml**

**Solución inyectable para bovino y ovino**

Tilmicosina



**Inyectables**

### **Mevet**

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

## Inyectables

### TILMISONE 300 mg/ml Solución inyectable para bovino y ovino Tilmicosina



#### COMPOSICIÓN POR ml

##### Sustancia activa:

Tilmicosina 300 mg

##### Excipientes:

Propilenglicol 250 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Bovino y ovino.

#### INDICACIONES DE USO

**Bovino:** tratamiento del síndrome respiratorio bovino asociado a *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*. Tratamiento de la necrobacilosis interdigital.

**Ovino:** tratamiento de infecciones de las vías respiratorias causadas por *Mannheimia haemolytica* y *Pasteurella multocida*. Tratamiento del pederro causado por *Dichelobacter nodosus* y *Fusobacterium necrophorum*. Tratamiento de la mastitis aguda ovina causada por *Staphylococcus aureus* y *Mycoplasma agalactiae*.

#### TIEMPOS DE ESPERA

**Bovino:** carne: 70 días. Leche: 36 días.

**Ovino:** carne: 42 días. Leche: 18 días.

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administrar una única inyección subcutánea de 10 mg de tilmicosina por kg de peso vivo (equivalente a 1 ml de medicamento/30 kg p.v.).

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 30 °C. Conservar el vial en el envase exterior para proteger de la luz. No congelar. No conservar a temperatura superior a 25 °C después de extraer la primera dosis.

#### FORMATOS

Cajas de 1, 6, 10 y 12 viales de 50 ml, 100 ml y 250 ml

#### Nº REGISTRO

2080 ESP

