



Inyectables

**Orales**

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

**COCCIKLASS 50 mg/ml**

**Suspensión oral**

Toltrazurilo



**Orales**

**Mevet**

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

## Orales

### COCCIKLASS 50 mg/ml Suspensión oral Toltrazurilo



#### COMPOSICIÓN POR ml

##### Sustancia activa:

Toltrazurilo 50 mg

##### Excipientes:

Benzoato de sodio (E 211) 2,1 mg

Propionato de sodio (E 281) 2,1 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Porcino (lechones de 3 a 5 días).

#### INDICACIONES DE USO

Para la prevención de los signos clínicos de la coccidiosis en lechones neonatales (de 3 a 5 días) en granjas con una historia confirmada de coccidiosis causada por *Isospora suis*.

#### TIEMPO DE ESPERA

Carne: 73 días.

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración por vía oral.

Tratamiento animal individualizado.

Cada cerdo debe ser tratado en el día 3-5 de vida con una dosis oral única de 20 mg de toltrazurilo por kg de peso vivo (equivalente a 0,4 ml de medicamento por kg de peso vivo).

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

#### FORMATOS

Caja con 1 frasco de 250 ml

Caja con 15 frascos de 250 ml

Frasco de 1 litro

#### Nº REGISTRO

2908 ESP

