



Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

LINCOVALL 400 mg/g
Polvo para administración en agua de bebida
Hidrocloruro de lincomicina



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Orales

LINCOVALL 400 mg/g Polvo para administración en agua de bebida Hidrocloruro de lincomicina



COMPOSICIÓN POR g

Sustancia activa:

Lincomicina (hidrocloruro) 400 mg

ESPECIES DE DESTINO

Porcino y aves (pollos de engorde).

INDICACIONES DE USO

Porcino: para el tratamiento de la disentería porcina causada por cepas de *Brachyspira hyodysenteriae* sensibles a la lincomicina.

Aves (pollos de engorde): para el control de la enteritis necrótica causada por cepas de *Clostridium perfringens* sensibles a la lincomicina.

TIEMPO DE ESPERA

Porcino: carne: cero días.

Pollos de engorde: carne: cero días.

Huevos: su uso no está autorizado en aves cuyos huevos se utilizan para el consumo humano.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

Porcino: administrar 5-10 mg de lincomicina /kg p.v./día un mínimo de 5 días y un máximo de 10 días consecutivos (equivalente a 12,5-25 mg del medicamento /kg p.v./día).

Aves (pollos de engorde): administrar 3-6 mg de lincomicina/kg p.v./día, durante 7 días consecutivos (equivalente a 7,5-15 mg del medicamento/kg p.v./día).

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Este medicamento veterinario no requiere condiciones especiales de conservación.

FORMATOS

Bolsa de 150 g

Bolsa de 1 kg

Nº REGISTRO

1987 ESP

