



Inyectables

**Orales**

Premezclas medicamentosas

Nutracéuticos

Desinfectantes / Higiene

## OXITEVALL POLVO

Polvo para administración en agua de bebida

Oxitetraciclina hidrocloreuro



Orales

**Mevet**

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

## Orales

### OXITEVALL POLVO

Polvo para administración en agua de bebida

Oxitetraciclina hidrocloreuro



#### COMPOSICIÓN POR g

##### Sustancia activa:

Oxitetraciclina (hidrocloreuro) 869,6 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Terneros, corderos, cerdos y pollos de engorde

#### INDICACIONES DE USO

**Terneros y corderos:** neumonías, fiebre del transporte, difteria de los terneros, colibacilosis, actinobacilosis, leptospirosis, anaplasmosis y carbunco bacteridiano.

**Cerdos:** colibacilosis, neumonías, leptospirosis, mal rojo y rinitis atrófica.

**Pollos de engorde:** estrés, CRD, enteritis inespecíficas, sinovitis infecciosa y cólera aviar.

#### TIEMPO DE ESPERA

**Terneros, corderos y cerdos:** carne: 10 días.

Leche: no administrar a hembras en lactación cuya leche se destine a consumo humano.

**Pollos de engorde:** carne: 7 días.

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

100-200 mg de oxitetraciclina (hidrocloreuro)/litro de agua de bebida (equivalente a 1/2-1 bolsa de OXITEVALL POLVO/1.000 litros de agua), durante 4-5 días.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a no más de 25 °C, en lugar seco y al abrigo de la luz.

#### FORMATOS

Bolsa con 230 g

#### Nº REGISTRO

1231 ESP

