



Mevet

Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

RESPIFLOR 100 mg/ml

Solución para administración en agua de bebida para porcino

Florfenicol



Orales

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Orales

RESPIFLOR 100 mg/ml Solución para administración en agua de bebida para porcino Florfenicol



COMPOSICIÓN POR ml

Sustancia activa:

Florfenicol 100 mg

ESPECIES DE DESTINO

Porcino.

INDICACIONES DE USO

Tratamiento y metafilaxis a nivel de grupo donde estén presentes signos clínicos de la enfermedad respiratoria porcina asociada con *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a florfenicol.

La presencia de la enfermedad debe ser establecida en el rebaño antes de iniciar el tratamiento metafiláctico.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 20 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

Porcino: 10 mg de florfenicol por kg de peso vivo por día en agua de bebida durante 5 días consecutivos.

Basándose en la dosis recomendada y en el número y peso de los animales a tratar, la cantidad diaria exacta de medicamento veterinario debe calcularse según la siguiente fórmula:

$$\frac{X \text{ ml medicamento veterinario/ kg p.v./día} \times \text{Peso vivo medio (kg) de los animales a tratar}}{\text{Media del consumo de agua (litros) por animal}} = \frac{X \text{ ml de medicamento veterinario por litro de agua de bebida}}$$

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

FORMATOS

Frascos de 500 ml

Frasco de 1 litro

Bidones de 5 litros

Nº REGISTRO

3817 ESP