



Mevet

Injectables

**Orales**

Premezclas medicamentosas

Nutraceuticos

Desinfectantes / Higiene

**RESPIFLOR 100 mg/ml**

**Solución para administración en agua de bebida para porcino**

Florfenicol



**Orales**

**Mevet**

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

[www.mevet.es](http://www.mevet.es)

## Orales

---

### RESPIFLOR 100 mg/ml

### Solución para administración en agua de bebida para porcino

### Florfenicol



#### COMPOSICIÓN POR ml

##### Sustancia activa:

Florfenicol 100 mg

#### ESPECIES DE DESTINO

Porcino.

#### INDICACIONES DE USO

Tratamiento y metafilaxis a nivel de grupo donde estén presentes signos clínicos de la enfermedad respiratoria porcina asociada con *Actinobacillus pleuropneumoniae* y *Pasteurella multocida* sensibles a florfenicol.

La presencia de la enfermedad debe ser establecida en el rebaño antes de iniciar el tratamiento metafiláctico.

#### TIEMPO DE ESPERA

**Carne:** 20 días.

#### POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en agua de bebida.

**Porcino:** 10 mg de florfenicol por kg de peso vivo por día en agua de bebida durante 5 días consecutivos.

Basándose en la dosis recomendada y en el número y peso de los animales a tratar, la cantidad diaria exacta de medicamento veterinario debe calcularse según la siguiente fórmula:

$$\frac{X \text{ ml medicamento veterinario/ kg p.v./día} \times \text{Peso vivo medio (kg) de los animales a tratar}}{\text{Media del consumo de agua (litros) por animal}} = \frac{X \text{ ml de medicamento veterinario por litro de agua de bebida}}{\text{Media del consumo de agua (litros) por animal}}$$

#### PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

No conservar a temperatura superior a 25 °C.

#### FORMATOS

Frasco de 1 litro

Bidones de 5 litros

#### Nº REGISTRO

3817 ESP