



Inyectables

Orales

Premezclas medicamentosas

Alimentos funcionales

Desinfectantes

DOXICIVALL 125 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino

Hiclato de doxiciclina



Premezclas medicamentosas

Mevet

Polígono Industrial El Segre

Parc. 409-410

25191 Lleida, España

T. +34 973 210 269

www.mevet.es

Premezclas medicamentosas

DOXICIVALL 125 mg/g

Premezcla medicamentosa para porcino

Hiclato de doxiciclina



COMPOSICIÓN POR g

Sustancia activa:

Doxiciclina (hiclato) 125 mg

Excipientes:

c.s.

ESPECIES DE DESTINO

Porcino (cerdos de engorde).

INDICACIONES DE USO

Cerdos de engorde: tratamiento y control de pleuroneumonía causada por cepas de *Actinobacillus pleuropneumoniae* sensibles a la doxiciclina.

TIEMPO DE ESPERA

Carne: 5 días.

POSOLOGÍA PARA CADA ESPECIE, MODO Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN

Administración en el alimento.

La premezcla se administra directamente mezclada con el pienso a la siguiente dosis:

10-12 mg de doxiciclina/kg p.v./día, equivalente a una dosis de 80-95 mg de premezcla/kg p.v./día.

El tratamiento debe continuarse durante 8 días.

Se recomienda usar la siguiente fórmula:

$$\text{Mg de premezcla por kg de pienso} = \frac{80-95 \text{ mg de premezcla por kg p.v./día} \times \text{Peso medio de los animales tratados (kg)}}{\text{Consumo medio de pienso / animal (kg)}}$$

Debe determinarse el peso de los animales con la mayor exactitud posible para evitar una dosificación insuficiente.

La tasa recomendada de incorporación en pienso sería de 2 kg de DOXICIVALL 125 mg/g por Tm de pienso.

PRECAUCIONES ESPECIALES DE CONSERVACIÓN

Conservar a temperatura inferior a 30 °C.

FORMATOS

Saco de 20 kg

Nº REGISTRO

1974 ESP

